

海外赴任地域別の推奨予防接種一覧〈成人〉:3ヶ月以上の中・長期滞在時の大凡の目安(2018.3 改訂)

ワクチン名	DPT(含破傷風)		ポリオ	A型肝炎	B型肝炎	日本脳炎	狂犬病	黄熱	コレラ	腸チフス	髄膜炎菌	ダニ駆除	MMRV	マラリア
渡航先 国名・地域名	破傷風単独は通常不要 DPT/DPT-IPV/Tdap/TT(*) S43年以前生 S44年以降生		S50-52年 生まれは 1回追加	2回で2年 3回で10年	短期の出張 では不要 行動に注意	未接種者と 30歳代2回 20歳代1回	咬傷後に 必ず5回 事前は3回	国際検疫病 検疫所に確認 生運有効	通常不要 災害時に検討	流行状況 を考慮する	性髄膜炎 1回接種	2-3回 接種する	麻疹風疹おたふく 水痘抗体検査	マラロン メファキン ピナフ
北米 アメリカ・カナダ	◎	◎	×	△	○	×	×	×	×	×	△	×	◎	×
中南米 メキシコ・グアテマラ・チリ パナマ・ブラジル・ペルー アルゼンチン・ドミニカなど	◎	◎	×	◎	◎	×	△	○	×	△	△	×	◎	△
アマゾン地域 ブラジル・コロンビア ペネズエラ・ボリビア スリナム・ガイアナなど	◎	◎	×	◎	◎	×	○	◎	×	○	△	×	◎	◎
東アジア 中国・台湾・韓国・モンゴル 香港など	◎	◎	△	◎	◎	◎	△	×	×	×	×	×	◎	×
東南アジア都市部 タイ・マレーシア・ベトナム フィリピン・インドネシア シンガポールなど	◎	◎	△	◎	◎	◎	△	×	×	△	△	×	◎	×
インドシナ地域 ミャンマー・カンボジア ラオス・タイ北部 中国南部など	◎	◎	△	◎	◎	◎	△	×	×	○	△	×	◎	△
南西アジア インド・ネパール・ブータン バングラデッシュ パキスタン・モルディブなど	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	×	×	◎	△	×	◎	△
中央アジア アフガニスタン・グルジア カザフスタン・ウズベキスタン タジキスタン・中国西部など	◎	◎	○	◎	◎	△	○	×	×	○	○	△	◎	×
中近東 イラン・イラク・イスラエル サウジアラビア・ジョルダン アラブ首長国・トルコなど	◎	◎	◎	◎	◎	×	△	×	×	△	◎	×	◎	×
アフリカ北部・南部 エジプト・リビア・モロッコ アルジェリア・モーリタニア 南アフリカ・ジンバブエ ボツワナ・ナミビアなど	◎	◎	△	◎	◎	×	△	×	×	△	○	×	◎	△
アフリカ中央部 ナイジェリア・コンゴ・ガーナ ウガンダ・タンザニア・ケニア カメルーン・アンゴラなど	◎	◎	◎	◎	◎	×	○	◎	(△) 一部の地域	◎	◎	×	◎	◎
西欧 イギリス・フランス・ドイツ イタリア・スペイン・スイス ポルトガル・ベルギーなど	◎	◎	×	△	○	×	×	×	×	×	×	△	◎	×
北欧 ノルウェー・フィンランドなど	◎	◎	×	△	○	×	×	×	×	×	×	×	◎	×
東欧 ポーランド・ルーマニア ハンガリー・チェコなど	◎	◎	×	○	○	×	×	×	×	×	△	○	◎	×
ロシア圏 ロシア・ウクライナ・ラトビア ベラルーシ・リトアニアなど	◎	◎	△	○	◎	×	△	×	×	×	△	○	◎	×
ロシア(シベリア)	◎	◎	△	○	◎	×	△	×	×	×	△	○	◎	×
オセアニア オーストラリア・フィジー バブアニューギニア・パラオ ニュージーランド・トンガなど	◎	◎	×	△	○	×	×	×	×	×	×	×	◎	×
ワクチン名	DPT(含破傷風)		ポリオ	A型肝炎	B型肝炎	日本脳炎	狂犬病	黄熱	コレラ	腸チフス	髄膜炎菌	ダニ駆除	MMRV検査	マラリア

【 接種参考基準 ◎:是非とも、 ○:できれば、 △:状況によって、 ×:通常不要 】

2018.3 名称病院予防接種センター

*) S44年以降生まれでは破傷風単独(TT)は不要。S43年以前でも、欧米豪の先進国では百日咳を含むワクチン(Tdap)を要求される。

この表は、FORTHや外務省の表と同様に渡航ワクチンの大凡の目安です。詳細や具体的な予防接種計画は、別掲載の「渡航ワクチンの選択方法」、「考え方と上手なうち方」、「そのポイント」などを参照のこと。DPT/DPT-IPV、日本脳炎以外は海外製または輸入ワクチンを推奨。