

生ワクチンの抗体検査とA型肝炎・B型肝炎の評価

追加接種の推奨基準

〔検票記載の基準とは多少異なる。【 】:推奨する検査法〕

2019.4

麻疹〔はしか、ましん、Measles、Rubeola、Sarampo〕

追加接種基準

【NT】:4倍以上が陽性(罹患しない)・・・・・・・・・・ 4倍未満

【PA】:256倍以上が陽性(スクリーニング・入学時)・・・・・・・・ 128倍以下

(ELISA/IgG):8.0以上が陽性(緊急時のみ)・・・・・・・・・・ 8.0未満

風疹〔三日ばしか、Rubella〕

【HI】:16倍以上が陽性(罹患しない)・・・・・・・・・・ 8倍以下

妊娠希望女性:32倍以上・・・・・・・・・・ 16倍以下

【ELISA/IgG】:6.0以上が陽性(暫定値)・・・・・・・・・・ 6.0未満

妊娠希望女性:8.0以上(暫定値)・・・・・・・・・・ 8.0未満

おたふくかぜ〔ムンプス、流行性耳下腺炎、Mumps、Parotitis〕

【ELISA/IgG】:5.0以上が陽性(学童以降)・・・・・・・・・・ 5.0未満

:6.0以上が陽性(幼児ワクチン)・・・・・・・・・・ 6.0未満

水痘〔水ぼうそう、Chicken pox、Varicella-Zoster〕

【ELISA/IgG】:4.0以上が陽性・・・・・・・・・・ 4.0未満

:2.5以上が陽性(幼児ワクチン)・・・・・・・・・・ 2.5未満

B型肝炎〔HBs抗体〕

【Clia】:10.0以上が陽性・・・・・・・・・・ 10.0未満

A型肝炎〔HA抗体〕

【Clia】:1.0以上が陽性・・・・・・・・・・ 1.0未満