

## ワクチンの間違い例・勘違い例

- A)種類の確認不足、 B)母子手帳の確認不足、 C)年齢の確認不足、  
D)接種の知識不足、 E)手技未熟、注意不足、 F)保管と管理、その他

### (1) DPT (ジフテリア・百日咳・破傷風 三種混合)

- 5ヶ月児 1W 間隔で3回接種。・・・D)
- 1期初回 1W 間隔で3回接種。・・・D)
- 1期追加を1期初回3回目から1ヶ月後に接種。・・・D)
- 2回目と3回目 20日以上の間隔をあけずに接種。・・・B,D)
- 4ヶ月児 BCG 接種から20日間で接種。・・・B)
- 1期初回より3W 経ずに2回目接種。・・・B,D)
- 1期初回3回目より6ヶ月未満で追加接種。・・・B)
- 1期初回追加を接種後、再度接種。・・・B)
- 12歳7ヶ月児に1期追加を接種。・・・A,C)
- 子供に接種した後に使用した注射針が母の膝に刺さった。・・・E、F)
- 定期外の接種を定期として接種。・・・C)
- 1-2回の間隔を6日で接種した、1日不足だが。(医師から)・・・D)
- OPV から1週間で、DPT の4回目接種。(IPV と勘違い)・・・A,B)
- 有効期限切れを知らずに接種。・・・F)

## ワクチンの間違い例・勘違い例

- A)種類の確認不足、 B)母子手帳の確認不足、 C)年齢の確認不足、  
D)接種の知識不足、 E)手技未熟、注意不足、 F)保管と管理、その他

### (2) DT (破傷風・ジフテリア 二種混合)

- DT 対象者にMR 接種。・・・A,B)
- 2期を0.5ml で接種。・・・C,D)
- 13歳過ぎてDT を接種。・・・C,D)
- 1人に、気づかずに2回目接種。・・・B)
- 対象年齢前に0.5ml 接種・・・B,C)
- 13歳児に2回接種。・・・B,C)
- 定期の2期が済んでいて、16歳留学でDT を0.1ml 接種。・・・B,D)
- 有効期限切れを知らずに接種。・・・F)

## ワクチンの間違い例・勘違い例

- A)種類の確認不足、 B)母子手帳の確認不足、 C)年齢の確認不足、  
D)接種の知識不足、 E)手技未熟、注意不足、 F)保管と管理、その他

### ( 3 ) MR (麻疹・風疹 二種混合)

- MR 4 期対象者に DT を接種。・・・ A,D)  
1 期を 2 歳で接種。・・・ D)  
3 期、4 期の間に 2 回接種。・・・ D)  
日本脳炎予定者に接種。複数有。・・・ A,B,C,D)  
18 歳に 2 回接種。・・・ B)  
OPV 接種後 27 日あけずに接種。・・・ B)  
年に 2 回接種。・・・ B)  
1 期終了後、2 歳になる直前に再度接種。・・・ B)  
小 6 の子供に接種。・・・ A,C)  
2 期を年中児に接種。・・・ A,C)  
母子手帳記入ミスで 2 回接種。・・・ B)  
日本脳炎を接種。・・・ A)  
2 期 ( 5 歳 5 ヶ月 ) に DT を接種。・・・ A,D)  
2 期を 2 回接種。母子手帳の接種歴を見落とした。・・・ B)  
1 歳時にうち忘れていて、2 期の後に追加を計画。・・・ D,F)

## ワクチンの間違い例・勘違い例

- A)種類の確認不足、 B)母子手帳の確認不足、 C)年齢の確認不足、  
D)接種の知識不足、 E)手技未熟、注意不足、 F)保管と管理、その他

### ( 4 ) 日本脳炎

- 追加を 2 回目から 3 ヶ月で接種。・・・ B,D)  
3 歳未満児に 0.5 ml で接種。・・・ D,F)  
シリンジと針かはずれ液もれ。・・・ E)  
外国人に対する接種回数や間隔の間違い。・・・ B,C,D)  
7 歳半 ~ 9 歳未満の子供に定期と勘違いで接種。・・・ C,D)  
接種済みの子供に再接種。( 母子手帳記録なし。 )・・・ B,F)  
初回 2 回目と追加を 10 日間で接種。・・・ B,D)  
初回対象児 ( 6 歳 1 ヶ月 ) に MR を接種。・・・ A,B)  
兄弟で同じ注射器で接種。・・・ D,E)

## ワクチンの間違い例・勘違い例

A)種類の確認不足、 B)母子手帳の確認不足、 C)年齢の確認不足、  
D)接種の知識不足、 E)手技未熟、注意不足、 F)保管と管理、その他

### ( 5 ) OPV (生ポリオ)

OPV 接種後 27 日間以上あけずに MR ワクチン ( 1 期 ) を接種。 . . . B )  
( 1 歳健診で来院されたところを、MR を早く接種した方が良いと思い、その場  
で接種。 )

1 回目と 2 回目の間隔 41 日以内で接種。 . . . B )

50 - 52 年生まれに、子供と同時接種を指導。 . . . D, F )

内服後 30 分以内に嘔吐したが再接種しなかった。 . . . D, E, F )

### ( 6 ) BCG

27 日経過後前に DPT 1 回目接種。 . . . B, D )

BCG を医療機関で接種したが、1 箇所しか管針を押されなかった。

( 予防接種手技の認識違い。 ) . . . D, E, F )

液を広げるのに針で引っ掻いたので、余分に傷がついた。 . . . D, E )

三角筋部、あるいは肘の近くに接種した。 . . . D, E )

### ( 7 ) Hib (ヘモフィルスインフルエンザ b)

季節性インフルエンザと間違えて接種。 . . . A, D )

### ( 8 ) PPV (年配者用肺炎球菌)

ニューモバックスを 2 歳児に接種。 . . . A, D )