

## 狂犬病ワクチン／破傷風トキソイド 接種記録表

(Inactivated Rabies vaccine/Tissue culture)/Tetanus Toxoid

(Vaccination Records)

氏名： (Name) [男性・女性] (Gender M/F)

生年月日： (Birthday) / / [ 歳] (age)

### 【組織培養不活化狂犬病ワクチン Inactivated Rabies vaccine [Tissue culture]】

回数 (Time)	接種予定日※ (Expected date of injection)	接種日／製造番号 (Injection date/Lot.No.)	接種医療機関 (Hospital/Signature)
1	年(y) 月(m) 日(d) 0日 (0day)	製造番号: (Lot.No.)	
	年 月 日	年 月 日	
2	3日後 (3day)	製造番号: (Lot.No.)	
	年 月 日	年 月 日	
3	7日後 (7day)	製造番号: (Lot.No.)	
	年 月 日	年 月 日	
4	14日後 (14day)	製造番号: (Lot.No.)	
	年 月 日	年 月 日	
5	30日後 (30day)	製造番号: (Lot.No.)	
	年 月 日	年 月 日	
6	90日後 (90day)	製造番号: (Lot.No.)	
	年 月 日	年 月 日	

※接種予定日下段左側は暴露後免疫(咬まれた後の発症阻止)、右側は暴露前免疫(予防的接種)のスケジュールです。

### 【沈降破傷風トキソイド Adsorbed Tetanus Toxoid】

1	年(y) 月(m) 日(d) 0日 (0day)	製造番号: (Lot.No.)
	年 月 日	年 月 日
2	3-8週後 (after 3-8weeks)	製造番号: (Lot.No.)
	年 月 日	年 月 日
3	6ヵ月以上 (after 6months)	製造番号: (Lot.No.)
	年 月 日	年 月 日

あなたの予防接種歴を記録するものです。大切に保管して、毎回記録を残して下さい。

### 【狂犬病について】

狂犬病は、狂犬病ウイルスに感染している動物に咬まれたり、なめられたりすることで感染し、約1ヵ月後(2週～3ヵ月くらい)に発病します。発病した場合には、ほぼ100%死亡するという危険な疾患であり、初めはかぜのような症状に加え、強い不安感、神経過敏症状(光や音・振動などに対する異常な反応や幻覚など)を示し、その後全身の麻痺から昏睡状態となり、呼吸不全で死亡します。発病から死亡までは2～6日といわれています。咬まれたら、その当日又はできるだけ早く接種を開始し、以降3日、7日、14日、30日、90日後(初回接種日からの日数)に6回の接種が必要です※。

※WHOの方式は必要であれば90日を省略してよいとしています。

### 【破傷風について】

破傷風菌は人から人へ感染するのではなく、土の中にひそんでいて外傷時の傷口から人へ感染します。傷口から菌が入り体の中で増え、菌の出す毒素のために、口が開かなくなったり、けいれんを起したり、死亡することもあります。患者の半数は自分や周りの人では気がつかない程度の軽い刺し傷が原因です。日本では特定の地域にしかありませんが、世界中の土壌中に菌はいますので、感染する機会は常にあります。

### 【予防接種を受けた後の注意】

1. 今日は過激な運動は避けて、注射部位は清潔にしておいてください。
2. 今晚入浴しても差し支えありません。
3. 注射後に注射部位が赤く腫れたり、痛んだりすることがありますが、通常2～3日で治ります。もし、高熱やけいれんなどの異常反応や体調の変化があれば、すみやかに医師の診察を受けてください。
4. まれに、30分以内に急な副反応が起ることがありますので様子を観察し、医師とすぐに連絡がとれるようにしておきましょう。
5. その他、何か心配なことがありましたら、ご相談ください。