

## 【A】途上国へ行く場合の「東南アジア・南西アジア」の推奨追加接種ワクチン【約3か月以上の出張や赴任】

海外赴任者とその家族[3ヶ月以上]			A型肝炎	破傷風	DPT	B型肝炎	日本脳炎	OPV/IPV	M/M/R/V #	狂犬病*	腸チフス	ツベルクリン	備考
本人	s43年以前生まれ		◎	◎	△	◎	◎	×	○	△	△	×	◎は2回接種し、1年後に追加。日本脳炎は2回のみ。DPTは1回のみ。
	s44年以後生まれ		◎	△	◎(1回)	◎	◎(1-2回)	△	○	△	△	×	A・B型肝炎は2回接種し、1年後に追加。OPV: s50-52年は追加
家族	s43年以前生まれ		◎	◎	△	◎	◎	×	○	△	△	×	破傷風とDPTは選択
	配偶者	s44年以後生まれ	◎	×	◎(1回)	◎	◎(1-2回)	△	○	△	△	×	破傷風とDPTは選択 OPV: s50-52年は1回追加(IPVは2回)。
子ども	大学生		◎	×	◎	◎	◎	◎	○	△	△	△	DPTは5年以上で1回追加 日本脳炎の2期から10年以上で追加
	中高生		◎	×	◎	◎	◎	◎	◎	△	△	△	DPTは5年以上で1回追加 日本脳炎の2期まで済ませる。
	学童		◎	×	◎	◎	◎	◎	◎	△	△	△	DPTは5年以上で1回追加 日本脳炎3-4回済ませる。
	幼児		◎	×	◎	◎	◎	◎	◎	△	△	△	A型肝炎は3歳以上では接種したい(要同意)
	乳児		○	×	◎	◎	◎	◎	×	△	×	△	9ヶ月以上で麻疹・水痘は接種可能(要同意)

短期出張者	3ヶ月以内	成人	◎	◎	◎	△	◎	×	×	△	△	×	破傷風とDPTは年齢による。
旅行者	1ヶ月以内	成人	○	○	○	×	△	×	×	△	△	×	破傷風とDPTは年齢による。 ツアー旅行なら対応次第で不要
滞在外国人 \$	長期滞在	成人	×	△	△	×	○	×	×	×	×	×	希望に沿って接種する 子どもは母国方式で接種する

◎:ぜひとも接種, ○:できれば接種, △:状況によっては ×:通常は不要, \*) 狂犬病は咬傷後に5回接種が必要。手に入る地域では事前予防は不要。事前接種希望者は3回接種(WHO方式)が必要。中南米・アフリカの場合は、日本脳炎が ×、狂犬病が △~○、になる。黄熱も考慮する #) M/M/R/V :麻疹/おたふく/風疹/水痘の抗体検査と追加接種。特に、学生と若い世代はMMRVの抗体陽性結果は必要。中高生以上のDPTの追加は、0. 2mlで1回のみ。30歳代は0. 5mlで1回。破傷風は不\$) 滞在外国人:途上国から来日。記録はないが、A型肝炎・B型肝炎は接種前に検査する。DPTと日本脳炎は追加したい。

【どの世代も、まず母子手帳で確認することが大事。あれば持参する。英語表記の接種記録(証明書)を発行して、渡航時に携行する。】

2012.10 名鉄病院予防接種センター

## 【B】先進国へ行く場合の「北米・欧州」の推奨追加接種ワクチン【約3か月以上の出張や赴任】

海外赴任者とその家族[3ヶ月以上]			A型肝炎	破傷風	DPT※	B型肝炎	日本脳炎+	OPV/IPV	M/M/R/V #	狂犬病*	4価髄膜炎	ツベルクリン	備考
本人	s43年以前生まれ		△	◎	△	◎	×	×	○	×	×	×	破傷風とB型肝炎は考慮する。2回接種後1年後に追加。
	s44年以後生まれ		△	△	◎(1回)	◎	×	△	○	×	×	×	DPTとB型肝炎は考慮する。 OPV: s50-52年は1回追加
家族	s43年以前生まれ		△	◎	△	○	×	×	○	×	×	×	破傷風とB型肝炎は考慮する。2回接種後1年後に追加。
	配偶者	s44年以後生まれ	△	×	◎(1回)	○	×	△	○	×	×	×	DPTとB型肝炎は考慮する。 OPV: s50-52年は1回追加
子ども	大学生		△	×	◎	○	×	◎	◎	×	◎	◎	DPTは5-10年以上で追加。Tdapを推奨。寮生は髄膜炎を推奨。
	中高生		△	×	◎	◎	×	◎	◎	×	○	◎	DPTは5年以上で追加。Tdapを推奨。寮生は髄膜炎を推奨。
	学童		△	×	◎	◎	×	◎	◎	×	○	◎	DPTは5回目を追加。
	幼児		△	×	◎	◎	×	◎	◎	×	×	△	日本の定期以外は、ムンプス・水痘・B型肝炎を追加する
	乳児		△	×	◎	◎	×	◎	×	×	×	×	時間がなければBCGとB型肝炎のみ接種し、現地で5種混合とROTA

短期出張者	3ヶ月以内	成人	△	◎	◎	△	×	×	×	×	×	×	破傷風とDPTは年齢による。 A型肝炎・B型肝炎は地域と行動による。
旅行者	1ヶ月以内	成人	△	○	○	△	×	×	×	×	×	×	破傷風とDPTは年齢による。
滞在外国人 \$	長期滞在	成人	×	△	○	×	○	×	×	×	×	×	希望に沿って接種する

◎:ぜひとも接種, ○:できれば接種, △:状況によっては ×:通常は不要, \*) 狂犬病は咬傷後に5回接種が必要。地元の医師にリスクを相談する。事前接種は不要。

アメリカの学校への入学には、MMRVの抗体陽性または追加接種が必要。ツベルクリンと胸部X線で、結核を否定する。英文証明書(+)ドイツ・東欧・ロシアではダニ脳炎も考慮する。通常3回接種する。

#) M/M/R/V :麻疹/おたふく/風疹/水痘の抗体検査と追加接種。 学生と若い世代はMMRVの抗体陽性結果は必要。学生にはツベルクリンの再検と英文証明書は必須。

※) DPTは1回。大学生と中高生は、できればTdap(青年用DTaP)で追加する。 \$) 滞在外国人:途上国から来日。記録はないが、A型肝炎・B型肝炎は接種前に検査する。DPTと日本脳炎は追加したい。

【どの世代も、まず母子手帳で確認することが大事。あれば持参する。英語表記の接種記録(証明書)を発行して、渡航時に携行する。】

2012.10 名鉄病院予防接種センター

