

## 海外の予防接種の実況 [2008-2013]

国名	中国の1例[基準]	タイ	マレーシア	ペルー[南米はほぼ同様]	アメリカ[通常全米で接種]	フランス	ドイツ	イギリス	日本[定期・任意・推奨]
出生時	BCG, HBIG	BCG	BCG, HBV①	BCG		BCG, HBV①	HBV①	[BCG]	
0か月	HBV①	HBV①		HBV1	HBV①				
1か月	HBV②	HBV②	HBV②		HBV②				HBV①(リスクが比較的高い場合)
2か月	DPT①、OPV①	DPT①、OPV①、Hib①	DPT①、IPV①、Hib①、PCV①	DPT①、OPV①、Hib①	DPT①、IPV①、Hib①、PCV①[5混 ROTA①	DPT①、IPV①、Hib①、HBV②[6混] PCV①	DPT①、IPV①、Hib①、PCV①、HBV②[6混]	DPT①、Hib①、IPV① PCV①、	Hib①、PCV①、HBV②、ROTA①
3か月				HBV②		DPT②、IPV②、Hib②、HBV③[6混] PCV②	DPT②、IPV②、Hib②、PCV②、HBV③[6混]	DPT②、Hib②、IPV② MEM-C①	DPT(DPT-IPV)①、Hib②、PCV②、 ROTA②
4か月	DPT②、OPV②	DPT②、OPV②、Hib②	PCV②	DPT③、OPV③、Hib③	DPT②、IPV②、Hib②、PCV②[5混 ROTA②	DPT③、IPV③、Hib③、HBV④[6混] PCV③	DPT③、IPV③、Hib③、PCV③、HBV④[6混]	DPT③、Hib③、IPV③ 、PCV②、MEM-C②	DPT(DPT-IPV)②、Hib③、PCV③、
5か月			DPT③、IPV③、Hib③、						BCG
6か月	DPT③、OPV③ HBV③	DPT③、OPV③、Hib③ HBV③	HBV③、PCV③		DPT③、(IPV③)、Hib③、PCV③ [4-5混]、HBV③、ROTA③				DPT(DPT-IPV)③、HBV③、ROTA③
9か月		MEA①[MMR①]	HBsAntibody検査	YF					
12か月	VAR①	JE①、JE②	MMR①、PCV④	MMR	HAV①-②(6カ月-1年間隔)	MMR①、PCV④	DPT③、IPV③、Hib③、PCV③	Hib④、MEM-C③	MR①、Hib④、PCV④
12-15か月	MMR①	MMR①[②]、VAR	VAR①		MMR①、VAR①	MEM-C	MMR①、VAR①、HBV⑤	PCV③、MMR①	MUM、VAR
15か月	JE①、JE②		JE①						
16か月			JE②			DPT④、IPV④、Hib④、HBV⑤、	MMR②、VAR②		
18か月	DPT④、OPV④	DPT④、OPV④、Hib④	DPT④、IPV④、Hib④	DPT④、OPV④、Hib④	DPT④、IPV③(4)、Hib④、PCV④		[①-②は3か月以上]		DPT(DPT-IPV)④
24か月		HAV①、JE③	HAV①			MMR②			
28か月	JE③		JE③						
30か月		HAV②	HAV②						
3歳									JE①、JE②(1-4週間隔)
4-6歳		MMR②[③] DT⑤、OPV⑤	VAR② MMR①、HBV④、DT、IPV⑤		MMR②、VAR②、DPT⑤、IPV④		Tdap①	DPT④、IPV④、MMR②	JE③(1年後)
6歳	MMR②、JE④ DT⑤、OPV⑤	JE④				DPT④、IPV④			MR②[小学入学前1年間]
11-12歳					MEM(ACYW:MCV4)、Tdap HPV①、②、③	DPT⑤、IPV⑤ HPV①、②、③	IPV⑤、HBV⑥ HPV①、②、③	HPV①、②、③[12-13歳]	DT⑤[11-12歳]
13-15歳							Tdap②[9-17歳]		HPV①、②、③[小6(12歳)から高1]
16-18歳						IPV⑥、dT・Tdap		IPV⑤、dT	
	都市部ではHibやPCVも乳児期に、MEM-Cも接種	都市部ではHibの他にPCVも乳児期に、MEM-Cも接種			dTまたはTdapで10年ごとに追加。	dTまたはTdap+IPVで10年ごとに追加。	dTまたはTdap+IPVで10年ごとに追加。	HBVは母がキャリアーで推奨。	通常のHBVは母がキャリアーで 母児感染予防:HBIG(1日・2か月)、 HBV(2・3・5か月)

略記号の説明[順不同]

BCG:結核菌、OPV:生ポリオ、IPV:不活化ポリオ、DPT:DTaP(ジフテリア+破傷風+百日咳)3種混合、DPT-IPV:DPT+不活化ポリオ4種混合、DT:DT(ジフテリア+破傷風)2種混合、ROTA:ロタ胃腸炎、Hib:ヘモフィルスインフルエンザb、PCV:肺炎球菌結合型7価・13価、

MMR:MMR(麻疹+おたふくかぜ+風疹)3種混合、MR:MR(麻疹+風疹)2種混合、MUM:おたふくかぜ、VAR:水痘、JE:日本脳炎、MEM(ACYW:MCV4):髄膜炎菌性髄膜炎4価[A/C/Y/W135]混合:MCV結合型、MEM-C:髄膜炎菌性髄膜炎C型、

HBV:B型肝炎、HBIG:B型肝炎グロブリン、HAV:A型肝炎、HPV:子宮頸癌(ヒトパルポ)、Tdap:青年用DPT(ジフテリア+破傷風+百日咳)3種混合、YF:黄熱[yellow fever]、FLU:インフルエンザHA、5種混合(DPT+IPV+Hib)、6種混合[5種+HBV]