

生ワクチンの抗体検査とA型肝炎・B型肝炎の評価

追加接種の推奨基準

〔検票記載の基準とは多少異なる。【 】:推奨する検査法〕

2023.8

麻疹〔はしか、ましん、Measles、Rubeola、Sarampo〕

追加接種基準

- 【NT】：4倍以上が陽性（罹患しない）・・・・・・・・・・ 4倍未満
【ELISA/IgG】：8.0以上が陽性（医療者以外のスクリーニング）・・・・ 8.0未満
：16.0以上陽性（医療機関入所時、医療系入学時）・・・・ 16.0未満
（PA）：256倍以上が陽性（以前の記録の評価、検査終了）・・・・ 128倍以下

風疹〔三日ばしか、Rubella〕

- 【HI】：16倍以上が陽性（罹患しない）・・・・・・・・・・ 8倍以下
妊娠希望女性：32倍以上・・・・・・・・・・ 16倍以下
【ELISA/IgG】：6.0以上が陽性（暫定値）・・・・・・・・・・ 6.0未満
妊娠希望女性：8.0以上（暫定値）・・・・・・・・・・ 8.0未満

おたふくかぜ〔ムンプス、流行性耳下腺炎、Mumps、Parotitis〕

- 【ELISA/IgG】：5.0以上が陽性（学童以降）・・・・・・・・・・ 5.0未満
：6.0以上が陽性（幼児ワクチン後）・・・・・・・・・・ 6.0未満

水痘〔水ぼうそう、Chicken pox、Varicella-Zoster〕

- 【ELISA/IgG】：4.0以上が陽性・・・・・・・・・・ 4.0未満
：2.5以上が陽性（幼児ワクチン）・・・・・・・・・・ 2.5未満

B型肝炎〔HBs抗体〕【Clia】：10.0以上が陽性・・・・・・・・・・ 10.0未満

A型肝炎〔HA抗体〕【Clia】：1.0以上が陽性・・・・・・・・・・ 1.0未満